

吸入指導チェック報告書(発作治療薬)

患者ID: _____
患者氏名: _____
担当医師名: _____

薬局名: _____
店名: _____
指導薬剤師名: _____

用法用量:(1回 吸入)

基本は医師の指示どおり(成人は1日8吸入まで、小児は1日4吸入まで)

次の吸入かで4時間あけること 発作時は20分間隔をあけて使用

【メプチンエアー・サルタノール】

		指導日			
①薬の効果を説明			/	/	/
②用法用量を説明					
③カウンターの確認・使用可能回数を説明	メプチンエアーは100吸入 サルタノールは200吸入  メプチンエアー  サルタノール(後ろにカウンターあり)				

<初回準備> (注意点)

④空噴霧	メプチンエアーは2回 サルタノールは不要			
------	-------------------------	--	--	--

<吸入手順> (注意点)

⑤吸入器を振る	ガスと薬が均一に混ざるよう しっかり振る 			
⑥息吐き	苦しくない程度に息を吐く			
⑦吸入器をくわえる	吸入口を軽く歯を噛んでくわえる			
⑧薬の吸入	息を吸い込み始めると同時に 1回ポンベを押して、 ゆっくり深く(3秒程度)吸い込む 			
⑨息止め	苦しくない程度にできるだけ長く止める(5秒程度)			
⑩息吐き	鼻からゆっくりと息を吐き出す			
⑪1回2吸入以上の場合は、⑥~⑩を繰り返す				
⑫うがい	必ず必要ではない			

保管・お手入れの説明	ポンベに水をかけない			
		確認者名		

◎正しくできる ○できているが再確認必要 △できていない

※補助資材



模擬薬とMEP-LEP

特記事項
